

FARMACEUTICKÁ CHEMIE

**LÉČIV PŮSOBÍCÍCH
NA KARDIOVASKULÁRNÍ,
TRÁVICÍ A VYLUČOVACÍ
SYSTÉM**

Martin Doležal
a kolektiv

Farmaceutická chemie

Léčiv působících na kardiovaskulární, trávicí a vylučovací systém

Martin Doležal a kolektiv

Recenzovali:

prof. MUDr. Radomír Hrdina, CSc.

prof. PharmDr. Kamil Musílek, Ph.D.

Autoři:

prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.

PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.

doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.

prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.

doc. PharmDr. Jan Zitko, Ph.D.

Vydala Univerzita Karlova

Nakladatelství Karolinum

Praha 2022

První vydání

© Univerzita Karlova, 2022

Text © Martin Doležal a kolektiv, 2022

ISBN 978-80-246-5102-6

ISBN 978-80-246-5118-7 (online : pdf)



Univerzita Karlova
Nakladatelství Karolinum

www.karolinum.cz
ebooks@karolinum.cz

OBSAH

PŘEDMLUVA	9
1. LÉČIVA S ÚČINKEM NA OBĚHOVOU A KREVŇÍ SOUSTAVU	10
1.1 Vazodilatancia	12
1.1.1 Nitráty a donátory NO	14
1.1.2 Deriváty xanthinu	19
1.1.3 Deriváty piperazinu	25
1.1.4 Dihydropyridiny	28
1.1.5 Prostaglandiny a jejich analoga	28
1.1.6 Antagonisté endotelinových receptorů	31
1.1.7 Vazodilatancia jiné struktury	33
1.2 Antihipertenziva	36
1.2.1 Léčiva interferující s renin-angiotensinovým systémem	39
1.2.1.1 Inhibitory reninu	40
1.2.1.2 Inhibitory angiotensinkonvertasy	41
1.2.1.3 Antagonisté angiotensinových receptorů AT ₁	50
1.2.2 Léčiva interferující s α -adrenergním, imidazolinovým a serotoninovým systémem	57
1.2.3 Betablokátory	62
1.2.4 Blokátory kalciových kanálů	68
1.2.4.1 Dihydropyridiny	68
1.2.4.2 Fenylalkylaminy	72
1.2.4.3 Benzothiazepiny	73
1.2.5 Hydrazinopyridaziny	76
1.2.6 Diuretika	78
1.3 Inotropika	79
1.3.1 Kardiotonické glykosidy	81
1.3.2 Katecholaminy	87
1.3.3 Inhibitory fosfodiesterasy 3	88
1.3.4 Vápníkové senzitizery	90
1.3.5 Bradiny	91
1.4 Antiarytmika	93
1.4.1 Alkaloidy	95
1.4.2 Amidy, anilidy a jejich analoga	97
1.4.3 Betablokátory	100
1.4.4 Fenylalkylaminy a benzothiazepiny	102
1.4.5 Antiarytmika jiné struktury	104
1.5 Antihyperlipidemika	108
1.5.1 Nikotinová kyselina a její deriváty	111
1.5.2 Iontoměniče	111
1.5.3 Fibráty	113
1.5.4 Vastatiny	116
1.5.5 Inhibitory absorpce cholesterolu	121
1.5.6 Monoklonální protilátky	122
1.5.7 Antihyperlipidemika jiné struktury	123
1.6 Léčiva ovlivňující srážení krve	126
1.6.1 Protidestičková (antiagregační) léčiva	127
1.6.1.1 Inhibitory cyklooxygenasy	128
1.6.1.2 Blokátory receptorů pro adenosindifosfát	130
1.6.1.3 Blokátory glykoproteinu IIb/IIIa (fibany)	133
1.6.1.4 Inhibitory fosfodiesterasy 3	135
1.6.1.5 Analogy prostaglandinů	135
1.6.1.6 Blokátory tromboxanových receptorů a inhibitory tromboxansynthasy	137
1.6.1.7 Blokátory membránových receptorů PAR 1 pro trombin	138

1.6.1.8 Inhibitory adheze trombocytů.....	139
1.6.1.9 Další antiagregancia	140
1.6.2 Antikoagulační léčiva.....	140
1.6.2.1 Heparin a jeho deriváty	146
1.6.2.2 Hirudin a jeho deriváty, protein C	152
1.6.2.3 Antagonisté vitamínu K.....	153
1.6.2.4 Xabany – přímé inhibitory faktoru Xa	156
1.6.2.5 Gatrany – přímé inhibitory trombinu (IIa)	158
1.6.2.6 Protisrážlivá činidla pro <i>in vitro</i> použití.....	159
1.6.3 Trombolytika.....	160
1.6.4 Antifibrinolytika.....	161
1.6.5 Povrchová hemostatika.....	163
1.7 Krevní náhrady	166
1.7.1 Krevní deriváty a modifikované proteiny.....	170
1.7.2 Polysacharidy	172
1.8 Ostatní léčiva s účinkem na oběhovou a krevní soustavu	174
1.8.1 Antianemika	174
1.8.2 Antiuratika.....	183
1.8.3 Venofarmaka	187
2. LÉČIVA S ÚČINKEM NA TRÁVICÍ A VYLUČOVACÍ SOUSTAVU	194
2.1 Acida	196
2.2 Antacida a antiulcerosa	197
2.2.1 Antacida.....	199
2.2.1.1 Systémová antacida	200
2.2.1.2 Nesystémová antacida	200
2.2.2 Antiulcerosa.....	201
2.2.2.1 Antagonisté H ₂ receptorů	202
2.2.2.2 Inhibitory H ⁺ /K ⁺ -ATPasy	203
2.2.2.3	207
Antiulcerosa jiných struktur	207
2.3 Antidiabetika	211
2.3.1 Antidiabetika pro léčbu diabetu 1. typu	216
2.3.1.1 Insulin.....	216
2.3.1.2 Analogy insulinu	220
2.3.1.3 Analogy amylinu	223
2.3.1.4 Analogy glukagonu	224
2.3.2 Antidiabetika pro terapii diabetu 2. typu.....	224
2.3.2.1 Deriváty sulfonylmočoviny	225
2.3.2.2 Deriváty benzoové kyseliny, glinidy	228
2.3.2.3 Deriváty biguanidu.....	230
2.3.2.4 Inhibitory střevní α-glukosidasy	231
2.3.2.5 Deriváty thiazolidindionu.....	232
2.3.2.6 Blokátory sodíko-glukosového kotransportéru SGLT-2, glifloziny.....	234
2.3.2.7 Inkretinomimetika	237
2.3.2.7.1 Perorální inhibitory DPP-4, gliptiny.....	238
2.3.2.7.2 Agonisté receptoru GLP-1.....	241
2.4 Laxativa.....	246
2.4.1 Osmoticky působící laxativa	248
2.4.2 Laxativa zvětšující střevní obsah.....	251
2.4.3 Lubrikační a změkčující laxativa.....	253
2.4.4 Kontaktní laxativa	254
2.4.4.1 Antraglykosidy	255
2.4.4.2 Fenolická laxativa.....	255
2.4.5 Ostatní syntetická laxativa.....	257
2.5 Antidiarika.....	261

2.5.1 Střevní adsorbencia	263
2.5.2 Antibiotika a antiseptika působící ve st evech.....	264
2.5.3 Antidiaroika specificky působící ve střevech.....	266
2.5.4 Modifikátory střevní flóry	269
2.5.5 Léčiva idiopatických střevních zánětů	270
2.6 Diuretika.....	273
2.6.1 Osmotická diuretika	276
2.6.2 Sulfonamidová diuretika	277
2.6.2.1 Thiazidová diuretika, sulfonylový typ.....	278
2.6.2.2 Karbonylový typ.....	280
2.6.3 Kalium šetrící diuretika	285
2.6.4 Agonisté a antagonisté receptoru pro vasopresin	289
2.7 Antiemetika	291
2.7.1 Cholinolytika	293
2.7.2 H ₁ antihistaminika	294
2.7.2.1 Deriváty ethylendiaminu	294
2.7.2.2 Aminoethylethery.....	295
2.7.3 Antagonisté dopaminových receptorů	296
2.7.3.1 Neuroleptika ze skupiny derivátů fenothiazinu	296
2.7.3.2 Neuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonu	298
2.7.3.3 Benzamidy	298
2.7.4 Antagonisté serotoninových receptorů	300
2.7.5 Antagonisté neurokininových NK ₁ receptoru.....	303
2.7.6 Pyridoxin	305
2.7.7 Glukokortikoidy	305
2.7.8 Kanabinoidy	306
2.8 Ostatní léčiva ovlivňující trávicí a vylučovací systém	308
2.8.1 Emetika.....	308
2.8.2 Pankreatické enzymy a choleretika	309
2.8.3 Deflatulencia	312
2.8.4 Hepatoprotektiva	313
2.8.5. Ostatní	314
Seznam třípísmenných zkratk aminokyselin	316
Seznam zkratk nejpoužívanějších lékových forem.....	317
POUŽITÁ LITERATURA	318

„Policejní zákaz nemůže odstraniti nevědomost, v níž tkví každá pověra, tedy i pověra týkající se léčebných prostředků, vynalezených jen pro zisk vynálezce. Jedinou úspěšnou zbraní proti klamu je poučení.“

Česká hospodyně 1901, autor neuveden

PŘEDMLUVA

Další díl učebních textů z farmakochemie, určený pro studenty oboru Farmacie, se zabývá léčivý terapeutických skupin s účinkem na oběhovou a krevní soustavu, a dále léčivý s účinkem na trávicí a vylučovací soustavu. Obsahově a koncepčně navazuje na J. Hartl a kol.: FARMACEUTICKÁ CHEMIE III (kardiovaskulární systém a trávicí a vylučovací soustava), Karolinum, Praha 2000, a rovněž na předcházející díly, které jsou postupně vydávány na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové:

- J. Hartl, K. Palát: FARMACEUTICKÁ CHEMIE I (obecná část), Karolinum, Praha, 2. vydání, 2004.
- M. Doležal a kol.: FARMACEUTICKÁ CHEMIE LÉČIV PŮSOBÍCÍCH NA CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM, Karolinum, Praha, 2013.
- M. Doležal a kol.: FARMACEUTICKÁ CHEMIE LÉČIV PŮSOBÍCÍCH NA AUTONOMNÍ NERVOVÝ SYSTÉM, Karolinum, Praha, 2. vydání, 2016.
- J. Hartl a kol.: FARMACEUTICKÁ CHEMIE IV (protiinvazivní léčiva), Karolinum, Praha, 2. vydání, 2019.

Způsob rozdělení probírané materie do jednotlivých kapitol, skupin a podskupin, včetně členění pomocí číselných znaků, je zachován podobně jako v předcházejících dílech. V rámci jednotlivých farmakologických skupin za rozčleněním a definicí terapeutické skupiny následují vývojová studia skupiny a pro ně charakteristické struktury, dále zpravidla obecné závislosti účinku na chemické struktuře, mechanismus účinku a stručně údaje o praktickém využití.

Počet nových, prakticky používaných léčiv trvale roste. Z tohoto důvodu se učební text důsledně zaměřuje na skupinovou prezentaci léčiv a na typické zástupce jednotlivých skupin. Články mají jednotnou formální úpravu. Za českým mezinárodním nechráněným názvem následuje lékopisný a chemický název léčiva, který je u látek acidobazického charakteru vytvořen na volnou kyselinu (příp. volnou bazi). Pokud se účinná látka prakticky uplatňuje ve formě soli, je na tuto skutečnost upozorněno. V závěru jednotlivých článků je seznam v ČR registrovaných přípravků s danou účinnou látkou, vč. lékové formy. Uvedeny jsou nejprve monokomponentní přípravky, za nimi, pokud existují, následují přípravky kombinované.

Naše poděkování za pečlivou recenzi textu patří prof. PharmDr. Kamilu Musílkovi, Ph.D. a za velmi cenné připomínky z pohledu farmakologa děkujeme prof. MUDr. Radomíru Hrdinovi, CSc. Sekvenci aminokyselin peptidů pomocí jejich třípísmenných zkratk graficky zpracoval PharmDr. Martin Juhás.

Autoři

v Hradci Králové v květnu 2021

1. LÉČIVA S ÚČINKEM NA OBĚHOVOU A KREVŇÍ SOUSTAVU

Na počátku 21. století farmaceutická chemie (farmakochemie, medicínální chemie, drug design) studuje léčiva, která se vyznačují stále větší strukturní rozmanitostí. Kromě systematického studia přírodních produktů a malých syntetických ligandů, zkoumá modifikované peptidy a proteiny, biologická léčiva (zejm. monoklonální protilátky, oligonukleotidy), popř. multifunkční molekulární komplexy (tzv. komplexní léčiva).

První část učebního textu je věnována farmakochemii léčiv určených k léčbě onemocnění srdce a cév, popř. krevní soustavy. Onemocnění oběhového systému stojí na předním místě mezi příčinami úmrtí ve vyspělých zemích. V České republice zůstávají kardiovaskulární choroby dlouhodobě nejčastější příčinou úmrtí, umírá na ně 50 % populace. Jejich četnost je dána tím, že kromě genetické dispozice mohou být u daného jedince vyvolány tzv. civilizačními rizikovými faktory (nevhodná skladba potravy a její vysoký příjem, málo pohybu, stres, kouření, konzumace alkoholu, vysoká hladina tuků v krvi, diabetes apod.). Díky tomu, že v posledních dekádách dvacátého století byla vyvinuta nová účinná léčiva zejména proti hypertenzi a hyperlipidemiím, podařilo se úmrtnost na kardiovaskulární choroby ve vyspělých zemích významně omezit.

Mezi **vazodilatancia** řadíme léčiva určená k terapii a profylaxi anginy pectoris – antianginóza. Při záchvatu bolesti (stenokardii) zpravidla vyvolané stažením koronárních tepen je osvědčeným vazodilatátorem nitroglycerin. Vazodilatačně aktivní nitráty lze použít i k prevenci záchvatů anginy pectoris. Pro zlepšení průtoku krve koronárními arteriemi se dále používají blokátory kalciových kanálů, pomocí β -blokátorů se prodlouží diastola a dojde ke zlepšení průtoku krve ischemickou srdeční svalovinou. Specifickou, strukturně nejednotnou, ale početně omezenou skupinu vazodilatancií tvoří tzv. cerebrální vazodilatancia (někdy též označovaná jako nootropika), která mají za úkol zvýšit prokrvení CNS, a tím navýšit utilizaci kyslíku a glukosy. Velkým přínosem bylo zavedení analogů prostaglandinů do léčby poruch periferního prokrvení, postihující především cévy dolních končetin. Specifickou skupinu tvoří léčiva určená pro terapii erektilní dysfunkce.

Nejdůležitější a nejpočetnější skupinou léčiv ovlivňujících kardiovaskulární systém jsou **antihypertenziva**, tj. léčiva snižující zvýšený arteriální krevní tlak. V současnosti se používá pět základních tříd antihypertenziv (inhibitory angiotensin konvertujícího enzymu – prily, antagonisté AT₁-receptorů – sartany, blokátory kalciového kanálu, adrenergní β -blokátory, diuretika). Terapii hypertenze lze začít monoterapií, často se však využívá kombinace strukturně odlišných léčiv s různými mechanismy účinku, nejčastěji v podobě tzv. fixních

kombinací. Vývoj nových antihypertenziv v 90. letech 20. století byl z hlediska návratu vynaložených finančních prostředků velice úspěšný, a zároveň je příkladem úspěšného výzkumu s praktickým dopadem na zlepšení kvality a prodloužení života stovek milionů pacientů.

Inotropika (dříve označovaná jako kardiotonika) jsou léčiva ovlivňující srdeční kontraktilitu, podstatou jejich účinku je tonizace srdečních svalových vláken, např. zvyšováním vápníku v buňkách myokardu. Kardioglykosidy, léčiva přírodního původu s nízkým terapeutickým indexem, jsou postupně nahrazovány bezpečnějšími syntetickými léčivy. V terapii srdečního selhávání se uplatňují diuretika (furosemid, hydrochlorothiazid, spironolakton), prily či sartany (inhibice renin-angiotensin-aldosteronového systému, RAAS), β -blokátory, a teprve na 4. místě pozitivně inotropní léčiva (digoxin).

Léčiva kardiovaskulárního systému dále zahrnují **antiarytmika** (antidysrytmika), která jsou určena k léčbě poruch srdečního rytmu. Farmakologická léčba je určena zejm. pro akutní stavy, zatímco chronická léčba dysrytmií je v posledních desetiletích nahrazována nefarmakologickými postupy.

Antihyperlipidemika (hypolipidemika) se široce využívají k léčbě dyslipidémie s cílem snížit riziko vzniku závažných komplikací aterosklerózy, zejména infarktu myokardu a mozkové cévní příhody. Hypolipidemicky aktivní vastatiny jsou příkladem ekonomicky nesmírně úspěšné terapeutické skupiny, která je předepisována stovkám milionů pacientů.

Do první části tohoto textu jsou přiřazena ještě léčiva ovlivňující srážení krve. Kapitola pojednává o **protidestičkových léčivech** a **antikoagulancích**, tj. látkách potlačujících vznik trombů, dále o **trombolyticích (fibrinolyticích)**, která rozpouštějí již vzniklé tromby. Přiřazena jsou **antifibrinolytika**, určená pro léčbu krvácivých stavů, a **povrchová hemostatika**, léčiva podporující hemostázu při nadměrném krvácení. Následuje část popisující **krevní náhrady** (plasmaexpandéry), což jsou makromolekulární látky užívané k udržení krevního plazmatického objemu v cévách, které se podávají se v infuzi při některých urgentních stavech (krvácení, šok, popáleniny).

Poslední kapitolou jsou Ostatní léčiva s účinkem na oběhovou a krevní soustavu. Zahrnují **antianemika**, léčiva pro terapii megaloblastické anémie, neutropenie s velkým počtem biologických léčiv, **antiuratika**, léčiva, která snižují urikemii a využívají se k léčbě dny a nakonec přírodní, polosyntetická a syntetická **venofarmaka**. Venofarmaka zahrnují částečně i antihemoroidalia, léčiva používaná v léčbě hemoroidů.

1.1 Vazodilatancia

1.1.1 Nitráty a donátory NO

glycerol-trinitrát, isosorbid-dinitrát, isosorbid-mononitrát, molsidomin

1.1.2 Deriváty xanthinu

pentoxifylin, xanthinol-nikotinát, dipyridamol, sildenafil, vardenafil, riocigvát

1.1.3 Deriváty piperazinu

cinarizin, trimetazidin, ranolazin

1.1.4 Dihydropyridiny

nimodipin

1.1.5 Prostaglandiny

poprostenol, treprostinil, iloprost, selexipag

1.1.6 Antagonisté endotelinových receptorů

bosentan, ambrisentan, macitentan

1.1.7 Vazodilatancia jiné struktury

naftidrofuryl, vinpocetin, buflomedil

Vazodilatancia jsou léčiva různých chemických struktur, která vyvolávají různým mechanismem vazodilataci na úrovni arterií, arteriol a vén. Používají se při léčbě různých typů kardiovaskulárních onemocnění. Klasifikace vazodilatancií spočívá v místě jejich účinku (koronární, periferní a centrální). Důležitá skupina **koronárních vazodilatancií** byla vyvinuta pro terapii anginy pectoris. Velký pokrok v posledních letech nastal především v terapii plicní hypertenze. Další typ léčiv, **periferní vazodilatancia**, se využívají při léčbě periferních vaskulárních chorob, jako jsou ischemická choroba dolních končetin, vzácná onemocnění thrombangiitis obliterans (Bürgerova choroba) a Raynaudův fenomén (konstrikce arteriol) nebo erektilní dysfunkce. Vazodilatační terapii ischemické choroby dolních končetin dnes zčásti nahrazuje či doplňuje antiagregační terapie, a dále terapeutické snížení viskozity krve. Speciální význam mají **centrální vazodilatancia** působící v centrálním nervovém systému (tzv. cerebrální vazodilatancia či nootropika).


V širším slova smyslu však rozeznáváme další vazodilatancia, a to α -blokátory (hydrazinoftalaziny, minoxidil), tak i blokátory vápníkových kanálů (L-typ vápníkového kanálu v hladké svalové cévní buňce) a léčiva ovlivňující systém renin-angiotensin-aldosteron (RAAS). Tato vazodilatačně aktivní léčiva se široce používají zejména v terapii hypertenze, a jsou proto zařazena do kapitoly 1.2 Antihypertenziva.

Vývoj vazodilatancií

K nejstarším vazodilatačním látkám používaným při léčbě stabilní (námahové) anginy pectoris patří soli a zejména estery kyseliny dusité a dusičné. **Isopentyl-nitrit** (ve starší literatuře označovaný nesprávně jako **amyl-nitrit**) byl připraven již roku 1867, později byl zaveden do praxe levnější derivát **glycerol-trinitrát**. Nažloutlá kapalina, která je známá pod nepřesným označením nitroglycerin, byla syntetizovaná roku 1846 a používala se pro své explozivní účinky ve stavebnictví a vojenství. Její antianginózní účinky byly objeveny v roce 1887. Obě léčiva však mají řadu nevýhodných vlastností (např. vyvolávají bolest hlavy, vykazují krátkodobý účinek), což podnítilo na počátku 20. století přípravu a následné studium série esterů dusičné kyseliny se čtyř-, pěti-, či šestisýtnými alkoholy. U těchto derivátů se bohužel nepotvrdily předpokládané zlepšené vlastnosti. V roce 1939 však byl syntetizován **isomannid-dinitrát**, u kterého bylo zjištěno dlouhodobější antianginózní působení. Další vývoj směřoval ke studiu vlastností jeho stereoizomeru **isosorbid-2,5-dinitrátu** (1948) a později i jeho metabolitu **isosorbid-mononitrátu** (zavedený do praxe 1982), tj. opět derivátu s delší dobou účinku. Dalším mezníkem v terapii anginy pectoris se stal rok 1988, kdy byl popsán nitrobuněčný mechanismus účinku nitrátů. Nitráty se působením volných thiolových skupin glutathionu mění na nitrosothiol, z něhož se v cévním endothelu uvolňuje **oxid dusnatý**. Endoteliální relaxační faktor (EDRF, objevený v r. 1980), který je totožný s oxidem dusnatým, stimuluje guanylátcyklastu v hladké svalovině cévní stěny, čímž dochází k její relaxaci.

Krátce před druhou světovou válkou byl zjištěn vazodilatační účinek pyridin-3-karboxylové kyseliny, tj. **nikotinové kyseliny**, od níž byly později odvozeny účinnější deriváty s odlišným mechanismem účinku typu **dihydropyridinových** blokátorů vápníkového kanálu, např. cerebrální vazodilatans **nimodipin** (syntetizovaný 1972).

U poruch prokrvení se uplatnily rovněž látky přírodního původu. **Teofylin** byl izolován r. 1888 z čajovníku *Camellia sinensi* L. (Theaceae), pěstovaného tradičně v Indii a Číně. Jeho velkou nevýhodou je špatná rozpustnost ve vodě, to se podařilo překonat v r. 1908 zavedením **aminofylinu**, ve vodě rozpustné soli teofylinu a ethylendiaminu.



Modifikací základní struktury purinových alkaloidů byly postupně získávány aktivnější sloučeniny. Již v roce 1948 byl získán např. polosyntetický derivát teofylinu **etofylin** se zvýšenou rozpustností ve vodě. Po roce 1945 byly studovány vazodilatační vlastnosti derivátu furanochromonu **khellinu** izolovaného již dříve z pakmínu (*Ammi visnaga* L., Apiaceae); dnes se tato sloučenina v praxi nepoužívá. Další vazodilatačně aktivní sloučeniny byly získány extrakcí ze živočišných tkání, koronárně nejúčinnější látkou této skupiny je **adenosin-trifosfát** (ATP). Další modifikace struktury purinových alkaloidů vedla k přípravě homopurinů a k zavedení **dipyridamolu** na začátku šedesátých let do praxe jako koronárního vazodilatátoru.

V šedesátých letech dvacátého století se dále uplatnily deriváty piperazinu, např. **cinarizin**, který byl původně připravený jako antihistaminikum. Řada vazodilatačně velmi účinných látek byla získána i z dalších farmakodynamických skupin (např. další vápníkový blokátor **diltiazem**, či α -blokátor **fentolamin**, mezi přímo působící vazodilatancia je možno zařadit i derivát thiazidových diuretik **diazoxid**, který otevírá K_{ATP} draslíkový kanál).

Po r. 1998 se díky zavedení **sildenafilu**, selektivního inhibitoru fosfodiesterasy 5 s vazodilatačním účinkem, a později jeho dalších analogů otevřely zcela nové možnosti v terapii erektilní dysfunkce.

Farmakoterapie anginy pectoris byla v posledních letech obohacena ještě o **ivabradin**, léčivo snižující srdeční frekvenci, dále o **nikorandil**, což je derivát nikotinamidu substituovaný dusičnou kyselinou. Antiischemickým modulátorem energetického metabolismu myokardu je **trimetazidin**. **Ranolazin** je selektivní inhibitor pozdního sodíkového kanálu s antiischemickými a metabolickými účinky. Významným přínosem první poloviny devadesátých let bylo zavedení prostaglandinů, např. **alprostadilu** (prostaglandinu E_1) a **treprostinilu**, do terapie pokročilých stavů ischemické choroby dolních končetin. Ještě větším úspěchem moderní medicíny je zavedení „termostabilních prostanoidů“, antagonistů endotelinových receptorů, inhibitorů fosfodiesterasy typu 5, a **riociguátu** do terapie plicní hypertenze.



1.1.1 Nitráty a donátory NO

Spolu s β -blokátory a blokátory vápníkového kanálu jsou důležitou skupinou antianginózních látek anorganické soli a zejména estery kyseliny dusité a dusičné. Mechanismus působení anorganických či organických nitritů a nitrátů je shodný. Vazodilataci způsobují přímým účinkem na hladkou svalovinu cév. Jsou to farmaka první volby při léčbě záchvatu anginy pectoris. Nitráty se působením volných sulfanylových (-SH) skupin glutathionu mění na

nitrosothiol, z něhož se pak v endoteliích uvolňuje **oxid dusnatý** (NO), který je identický s EDRF (endothelium-derived relaxing factor). Ten ovlivňuje guanylátcyklasu buněk hladkého svalu, což má za následek relaxaci hladkého svalu. V aterosklerotických tepnách je produkce EDRF snížena, což vysvětluje příznivý vliv nitrátů vyplývající z uvolnění NO zejména v této lokalizaci. Z tohoto pohledu můžeme všechny používané látky této skupiny označit za proléčiva, která v organismu uvolňují NO aktivující guanylátcyklasu.


Z anorganických sloučenin se ve skupině nitritů a nitrátů uplatnila jako vazodilatační látka pouze sodná sůl kyseliny dusité, **dusitan sodný** (NaNO_2), zatímco sodná sůl kyseliny dusičné je příliš toxická. Hlavní indikací dusitanu sodného je dnes otrava kyanidy a kyanovodíkem (záměrné navození methemoglobinémie), tzn. že se jedná o antidotum.

Na základě zjištění, že organické sloučeniny (estery) jsou méně toxické než anorganické sloučeniny (soli), byla další pozornost věnována esterům kyseliny dusité (nitrity) a kyselině dusičné (nitráty) s jedno-, či vícesytnými alkoholy. Ze skupiny esterů kyseliny dusité má dnes velmi omezené použití pouze **isopentyl-nitrit** (syn. **isoamyl-nitrit**, **amyl-nitrit**), 3-methyl-1-butyl-ester kyseliny dusité. Isopentyl-nitrit se dnes používá především jako antidotum při otravě kyanidy. Jeho detoxikační účinek spočívá, podobně jako u dusitanu sodného, v oxidaci hemoglobinu na methemoglobin, který váže kyanidové ionty za vzniku methemoglobinkyanidu (tato vazba není pevná). Díky svým vazodilatačním účinkům jsou tato látka a její nižší homolog **isobutyl-nitrit** zneužívány pro povzbuzení sexuální výkonnosti.




Protože klinické zkušenosti potvrdily, že deriváty kyseliny dusičné (nitráty) jsou účinnější než deriváty kyseliny dusité (nitrity), dominantní postavení v terapii anginy pectoris získaly estery kyseliny dusičné. Jsou to vesměs explozivní kapaliny, dříve používané ve formě nevýbušných ethanolických roztoků (1%). Nejstarší z esterů kyseliny dusičné a stále v praxi běžně používaný je **trinitrát glycerolu** (propantriol-trinitrát, nitroglycerin). Jedná se o lipofilní ester s rychlým nástupem účinku a krátkým eliminačním poločasem podávaný sublingválně. Tento triester je prekurzorem (proléčivem) a v organismu je postupně hydrolyzován přes diestery (1,2- a 1,3-dinitrát glycerolu) až na dusičný monoester glycerolu (1-mononitrát glycerolu), který poté uvolňuje aktivní oxid dusnatý. Příprava esterů dusičné kyseliny s vyššími analogy, tj. se čtyř-, pěti-, či šestisytnými alkoholy nepřinesla očekávané prodloužení účinku či zpomalení vstřebávání. Starší látkou této skupiny je např. **pentaerythritol-tetranitrát**, který

má eliminační poločas 6–8 hodin (díky aktivním metabolitům) a používá se výhradně k profylaxi vzniku stenokardie. Dalším studiem bylo potvrzeno, že účinnost nitrátů není úměrná počtu zbytků kyselin dusité či dusičné.



Nitráty s delší dobou účinku, dnes nejdůležitější látky pro profylaktickou léčbu, byly získány ve skupině esterů kyseliny dusičné s dianhydrohexitoly. Nejstarší sloučenina tohoto typu **isomannid-dinitrát** byla oproti nitroglycerinu sice odolnější vůči hydrolýze, avšak měla slabší vazodilatační účinky. Další vývoj vedl k jeho aktivnějšímu stereoizomeru **isosorbid-dinitrátu** a jeho metabolitu **isosorbid-mononitrátu**, obě sloučeniny se v praxi široce uplatnily. Isosorbid-dinitrát je dnes nejdůležitější léčivo skupiny, má delší eliminační poločas než trinitrát glycerolu a profylakticky působí několik hodin. Další jeho indikací je podpůrná terapie srdeční nedostatečnosti. Jedná se o proléčivo, které je v organismu metabolizováno na aktivní metabolity isosorbid-2-mononitrát (eliminační poločas 2 hodiny) a isosorbid-5-mononitrát (eliminační poločas 4–5 hodin). Protrahované působení isosorbid-dinitrátu lze tedy vysvětlit tím, že metabolit isosorbid-5-mononitrát má delší antianginózní aktivitu. Podobně jako u ostatních nitrátů s delší dobou účinku se při profylaktickém podávání isosorbid-dinitrátu objevuje tolerance (snížení účinku po opakovaném podávání vysokých dávek). Isosorbid-5-mononitrát, aktivní metabolit isosorbid-dinitrátu se proto používá zejména k profylaxi anginy pectoris.



[O-][N+]([O-])OCCNC(=O)c1ccccn1


molsidomin aktivní metabolity molsidominu

Glycerol-trinitrát

Lékopisný název: *Glyceroli trinitras solutio*

Synonyma: nitroglycerin, trinitroglycerin

Je to propan-1,2,3-triyl-trinitrát.

Přípravky: *NITRO POHL inf. sol.*, *NITROGLYCERIN-SLOVAKOFARMA tbl. slg.*,
NITROMINT spr. slg., *PERLINGANIT inf. sol.*

Isosorbid-dinitrát

Lékopisný název: *Isosorbidi dinitras dilutus*

Je to 1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol-2,5-dinitrát.

Přípravky: *CARDIKET RETARD cps. pro./tbl. pro.*, *ISOKET inf. sol./slg. spr. sol.*

Isosorbid-mononitrát

Lékopisný název: *Isosorbidi mononitras dilutus*

Je to 1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol-5-mononitrát.

Přípravky: *MONO MACK DEPOT tbl. pro.*, *MONOSAN tbl. nob.*, *MONOTAB 20 tbl. nob.*,
MONOTAB SR tbl. pro., *OLICARD RETARD cps. pro.*

Pentaerythritol-tetranitrát

Lékopisný název: *Pentaerithrityli tetranitras trituratus*

Je to 2,2-bis-[(nitrooxy)methyl]propan-1,3-diyl-dinitrát.

Přípravek: *PENTALONG tbl. nob.*

Molsidomin

Lékopisný název: *Molsidominum*

Je to *N*-(ethoxykarbonyl)-3-(morfolin-4-yl)sydnonimin.

Přípravky: *CORVATON FORTE tbl. flm.*, *MOLSIHEXAL RETARD tbl. flm.*

Nitroprussid sodný

Lékopisný název: *Natrii nitroprussias dihydricus*

Je to dihydrát pentakyano-nitrosylželezitanu sodného.

1.1.2 Deriváty xanthinu

Purinové sloučeniny hrají důležitou roli při látkové výměně, jsou součástí nukleových kyselin a enzymů. Xanthinové alkaloidy (deriváty 7*H*-purin-2,6-diolu) mají na organismus komplexní účinky, a to především psychostimulační, vazodilatační, bronchodilatační, diuretické, antitrombotické či antiagregační. Strukturu xanthinu lze znázornit dvěma tautomerními formami.




laktam-laktim tautomerie xanthinu


Mechanismus účinku této skupiny látek spočívá buď v inhibici fosfodiesterasy, nebo v přímém ovlivnění adenosinových receptorů (antagonismus). V posledních letech se věnuje stále větší pozornost terapeutickému ovlivnění adenosinových receptorů A₁ syntetickými analogy purinového bicyklu. Jako vazodilatacia se tyto látky používají při poruchách prokrvení CNS a poruchách periferního prokrvení. Skupinu vazodilatačně účinných derivátů, antagonisty A₁ receptorů, můžeme rozdělit na purinové alkaloidy (kofein, teofylin, teobromin), polosyntetické deriváty teofylinu, polosyntetické deriváty teobrominu (rolofylin, tonapofylin), a dále na jejich syntetické analogy, „nexanthinové deriváty“, u nichž byla podobnost základního skeletu s xanthinem zachována (např. pyrazolopyridinové deriváty).

Purinové alkaloidy, **kofein** (1,3,7-trimethylxanthin), a především dimethylxanthiny **teofylin** (1,3-dimethylxanthin) a **teobromin** (3,7-dimethylxanthin), mají komplexní účinky. Zatímco u kofeinu je převažující jeho centrální psychostimulační efekt, u dimethylxanthinových alkaloidů teofylinu a teobrominu převažuje jejich periferní působení (vazodilatační, bronchodilatační a diuretická aktivita). Účinky xanthinových alkaloidů do značné míry korelují s jejich fyzikálně-chemickými vlastnostmi (acidobazické vlastnosti, rozpustnost ve vodě a hydrofobní vlastnosti). Slabou bazicitu alkaloidů způsobuje volný elektronový pár na dusíku v poloze 9. Slabá kyselost teofylinu je způsobena přítomností protonu na dusíku v poloze 7, v případě teobrominu na dusíku v poloze 1. Zatímco kofein je tedy slabá zásada (nemá kyselou skupinu), teofylin a teobromin mají amfoterní charakter. Nízká rozpustnost těchto derivátů se řeší jednak přípravou ve vodě rozpustných solí se slabými organickými kyselinami (např. kofein s kyselinou citronovou) nebo bazemi (aminofylin, tj.


teofylin s ethylendiaminem), jednak pomocí solubilizačních přísad (kofein s benzoanem sodným, teobromin se salicylanem sodným).



kofein




teofylin




teobromin

Ve skupině polosyntetických derivátů teofylinu bylo zvýšení vazodilatační aktivity docíleno přípravou ve vodě rozpustnějších derivátů. Takové sloučeniny byly získány především náhradou vodíku hydrofilní skupinou. Jako substituenty se nejvíce uplatnily alifatické zbytky s jednou či více volnými hydroxylovými skupinami, např. **etofylin**.




etofylin

Vývojovými antagonisty adenosinového receptoru A₁ jsou **rolofylin**, či **tonapofylin**. Potenciální indikací těchto lipofilnějších derivátů teofylinu je např. akutní srdeční selhávání.




rolofylin





tonapofylin

Osvědčily se rovněž polosyntetické deriváty teobrominu. Substitucí vodíku alkoxytem byl získán **pentoxifylin**, derivát s 5-oxohexylovým zbytkem. Pentoxifylin je základním léčivem poruch centrálního i periferního prokrvení. Látka navíc zlepšuje reologické vlastnosti krve (snižuje její viskozitu) a má rovněž výrazné antiagregační účinky.




pentoxifylin

Stále významnější roli v terapii periferního prokrvení hrají syntetické analogy purinového bicyklu. Podmínkou účinku v této skupině je podobnost s purinovým kruhem; purinový kruh je buď je rozšířen o jeden uhlíkový atom (homology) nebo modifikován (analogy, atomy dusíku jsou v jiných polohách). K takovým látkám patří homolog purinového skeletu pyrimido[5,4-*d*]pyrimidinový derivát **dipyridamol**. Tento derivát homopurinu se používal jako koronární vazodilatans s antiagregačním účinkem (inhibice fosfodiesterasy v trombocytech). Syntetickým analogem purinových sloučenin je rovněž triazolo[1,5-*a*]pyrimidinový derivát **trapidil**, používal se jako koronární vazodilatans (angina pectoris). Působí také jako inhibitor fosfodiesterasy.




Do skupiny analogů můžeme přiřadit i **riocigvát**, pyrazolopyrimidinový analog purinu. Léčivo bylo zavedeno do klinické praxe v r. 2013. Jedná se o stimulátor solubilní guanylátcykasy, tzn. že zesiluje účinek oxidu dusnatého (NO) na guanylátcykasu, a zvyšuje tak produkci cyklického guanosin-monofosfátu (cGMP). Pro skupinu léčiv s tímto mechanismem účinku je vyhrazena koncovka *-cigvát*. Způsobuje rozšíření plicních tepen, používá se v terapii plicní hypertenze (chronická tromboembolická plicní hypertenze, plicní arteriální hypertenze). Díky unikátnímu mechanismu účinku umožňuje na rozdíl od dnes široce používaných inhibitorů fosfodiesterasy 5 ovlivnění syntézy cGMP i v případě snížené produkce NO v centrální cirkulaci, což je příznak typický pro plicní hypertenzi. Používá se ve formě

proléčiva (methyl-ester), jeho eliminační poločas je 12 hodin. Riocigvát je podáván perorálně. Z roku 2021 pochází fluorovaný a demethylovaný analog riocigvátu **vericigvát** (*VERQUVO tbl. flm.*).




Syntetickými analogy purinových sloučenin jsou rovněž **sildenafil** a jeho vyšší homolog **ildenafil**. Zařazení těchto sloučenin mezi deriváty xanthinu je dáno nejen analogickým pyrazolopyrimidinovým uspořádáním, ale též podobným mechanismem účinku; léčiva jsou selektivními inhibitory fosfodiesterasy 5 s vazodilatačním účinkem. Pro skupinu léčiv s tímto mechanismem účinku je vyhrazena koncovka *-afil*. Předpoklady pro vazodilatační účinek má i druhá část molekuly, 1-fenylsulfonyl-4-methylpiperazinové uskupení, které má vztah k vazodilataciím piperazinového typu (viz dále). Jedná se o tzv. hybridní léčiva, v jejichž molekule jsou kombinovány dva vazodilatační farmakofory (purin, piperazin). Sildenafil byl původně vyvíjen jako antianginózní vazodilatační léčivo, které v klinických testech nepřekonal srovnávací standard. Bylo tedy rozhodnuto studii ukončit. Pacienti byli vyzváni k odevzdání nespotrebovaného studovaného léčiva a pověřená osoba si povšimla, že zatímco všechny ženy vývojové léčivo odevzdaly, značná část mužů nikoli. Následná anketa mezi muži zjistila, že pocítovali zlepšení sexuálního života. Hlavní indikací sildenafilu se od r. 1998 stala *terapie erektilní dysfunkce* (původně nežádoucí účinek objevený v průběhu klinického testování). Mechanismus účinku sildenafilu a jeho derivátů v indikaci erektilní dysfunkce spočívá v inhibici izoenzymu fosfodiesterasy 5 v kavernózních tělesech genitálu. Eliminační poločas sildenafilu činí 3–5 h. Další významnou indikací sildenafilu se po r. 2005 stala terapie akutní plicní hypertenze. Z roku 2018 pochází zpráva o možném využití sildenafilu v terapii symptomů jet lag (desynchronizace cirkadiálních rytmtů). Sildenafil je tak příkladem úspěšného

několikanásobného repurposingu. Další analog xanthinových alkaloidů vardenafil (představitel tzv. mee-too drug modifikace sildenafilu) se vedle zmíněné alkylové homologie liší imidazolotriazinovým uspořádáním. Je to opět selektivní inhibitor isoenzymu fosfodiesterasy 5 s mírnými vazodilatačními účinky, hlavní indikací je terapie erektilní dysfunkce. Eliminační poločas vardenafilu je 4–5 hodin.




Pro úplnost je třeba zmínit další úspěšná léčiva erektilní dysfunkce se shodným mechanismem účinku, tj. inhibicí fosfodiesterasy 5, avšak s modifikovanou strukturou. Purin je u nich nahrazen indolem (tadalafil), popř. je zachován pouze pyrimidinový kruh (avanafil). Prodloužení eliminačního poločasu a zvýšení lipofility bylo dosaženo další aromatickou a heteroaromatickou substitucí (dioxolofenyl, pyrimidin). Derivát 2,5-diketopiperazinu, resp. 1,2,3,4-tetrahydro- β -karbolinu **tadalafil** se vyznačuje dlouhým eliminačním poločasem (17,5 h). Tadalafil se využívá i v terapii plicní arteriální hypertenze, popř. v terapii benigní hyperplázie prostaty. Vysoce selektivním inhibitorem je **avanafil**, s rychlým nástupem účinku (30–45 min.), má rovněž dlouhý eliminační poločas (6–17 h). Jedná se opět o chirální sloučeninu, v terapii erektilní dysfunkce se používá *S*-izomer.




Velký komerční úspěch této skupiny léčiv podnítl chemickou modifikaci sildenafilu (např. nitrosopropdenafil, acetildenafil). Samotný sildenafil, a zvláště jeho analogy (jako tzv. „designer drugs“) se objevují ve volně prodejných „bylinných“ afrodiziakálních produktech

(mj. i pod klamavým označením „tradiční čínská medicína“), navíc často jako nedeklarované příměsi. Většinou jsou nabízeny a prodávány nelegálně prostřednictvím internetu.



nitrosoprodinafil



acetildenafile

Etofylin

Je to 7-(2-hydroxyethyl)-1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purin-2,6-dion.

Přípravky: *OXYPHYLLIN tbl. nob.*

s teofylinem OXANTIL inj. sol.

Pentoxifylin

Lékopisný název: *Pentoxifyllinum*

Je to 3,7-dimethyl-1-(5-oxohexyl)-3,7-dihydro-2H-purin-2,6(1H)-dion.

Přípravky: *AGAPURIN inj. sol., tbl. pro., AGAPURIN RETARD tbl. obd., PENTILIN inj./inf.*

sol., tbl., TRENTAL inj., tbl. obd.

Riocigvát

Je to methyl-4,6-diamino-2-{1-[(2-fluorfenyl)methyl]-1H-pyrazolo[3,4-*b*]pyridin-3-yl}pyrimidin-5-yl(methyl)karbamát.

Přípravek: *ADEMPAS tbl. flm.*

Sildenafil

Lékopisný název: *Sildenafil citras*

Je to 5-[2-ethoxy-5-(4-methylpiperazin-1-ylsulfonyl)fenyl]-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-*d*]pyrimidin-7-on.

Přípravky: *AMFIDOR tbl. flm.*, *AZURVIG por. sus.*, *BALCOGA tbl. flm.*, *ECRITEN tbl. flm.*, *GRANPIDAM tbl. flm.*, *GRASIL tbl. flm.*, *KATORA 100/50 MG ŽVÝKACÍ TABLETY tbl. mnd.*, *MODRASIL tbl. flm.*, *OLVION tbl. flm.*, *REVATIO tbl. obd.*, *SILANYL flm. dis.*, *SILDENAFIL ACCORD/ACTAVIS/AUROVITAS/IBSA/MEDREG/MYLAN/RATIOPHARM/SANDOZ/TEVA tbl. flm.*, *VIAGRA tbl. obd.*, *VIZARSIN tbl. flm.*

Vardenafil

Lékopisný název: *Vardenafilum hydrochloridum trihydricum*

Je to 2-(2-ethoxy-5-((4-ethylpiperazin-1-yl)sulfonyl)fenyl)-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(3H)-on.

Přípravek: *LEVITRA tbl. flm.*, *tbl. dis.*, *VIVANZA tbl. flm.*, *tbl. dis.*

Tadalafil

Lékopisný název: *Tadalafilum*

Je to (6R,12aR)-6-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-6,7,12,12a-tetrahydropyrazino-[1',2':1,6]pyrido[3,4-b]indol-1,4-(2H,3H)-dion.

Přípravek: *ADCIRCA tbl. flm.*, *CIALIS tbl. obd.*, *FABERKA tbl. flm.*, *GEROCILAN tbl. flm.*, *REKIFRE tbl. flm.*, *TADALAFIL ACCORD/AOP/ARISTO/AUROVITAS/BELUPO/LILLY/MYLAN/PMCS/SANDOZ/STADA/TEVA/XANTIS tbl. flm.*, *TADARD tbl. flm.*, *TADILECTO tbl. flm.*, *TALMANCO tbl. flm.*, *ZENAVIL tbl. flm.*

Avanafil

Je to (S)-4-[(3-chlor-4-methoxybenzyl)amino]-2-[2-(hydroxymethyl)pyrrolidin-1-yl]-N-(pyrimidin-2-ylmethyl)pyrimidin-5-karboxamid.


Přípravek: *SPEEDRA tbl. nob.*

1.1.3 Deriváty piperazinu


Skupina sloučenin odvozených od substituovaného difenylmethylpiperazinu se rovněž vyznačuje komplexními účinky (vazodilatačními, antihistaminovými, antiemetickými). Právě substituované difenylmethylpiperazinové uspořádání je nositelem účinku, přičemž zvýšení lipofility, halogenace (F, Cl) vede ke zvýšení aktivity (zejm. v oblasti CNS). Jedná se o skupinu nespecifických antagonistů vápníkových kanálů.

N-alkylpiperazinový derivát **cinarizin** je vazodilatans s antiemetickými účinky, má komplexní antihistaminové, antiserotoninové, antidopaminergní účinky. Ze starších sloučenin

Lze zmínit fluorovaný analog s obdobnými vlastnostmi **flunarizin**, který se používal jako nootropikum, popř. k profylaxy migrény. Chlorovaným derivátem byl **meklozin**, vazodilatans určené pro terapii všech typů závratí.




cinarizin
(se zvýrazněným farmakoforem)




flunarizin


Dalším piperazinovým derivátem je **trimetazidin**. Je to benzylpiperazinový derivát s odlišným mechanismem účinku (inhibice utilizace mastných kyselin v myokardu, snížení spotřeby kyslíku). Je určen k profylaxi a terapii anginy pectoris v monoterapii, jeho eliminační poločas činí 6 hodin. Trimetazidin je na seznamu zakázaných látek v atletice jako modulátor srdečního metabolismu. Novější **ranolazin**, derivát piperazinacetamidu, je rovněž určen k léčbě anginy pectoris. Ve struktuře ranolazinu můžeme zároveň najít aryloxyaminopropanolový fragment, typický pro betablokatory. Ranolazin je blokátorem sodíkového kanálu v myokardu s prodlouženým eliminačním poločasem (7 až 9 h).



meklozin




trimetazidin



ranolazin

Analogické 1-fenylsulfonyl-4-methylpiperazinové uskupení najdeme též ve struktuře již zmíněných léčiv erektilní dysfunkce **sildenafilu**, **vardenafilu**, hybridních sloučenin spojujících purinový a piperazinový farmakofofor (viz kapitola 1.1.2).

Fenylpiperazinové uspořádání najdeme v molekule **flibanserinu**, který je určen pro léčbu nízké sexuální touhy u žen, původně byl vyvíjen jako antidepresivum. Tento benzimidazolový derivát je agonista receptorů 5-HT_{1A}, velmi slabý parciální agonista/antagonista receptorů D₄ a antagonist receptorů 5-HT_{2A}. Snižuje tak hladinu 5-hydroxytryptaminu, který inhibuje sexualitu a zvyšuje hladinu dopaminu, který má naopak sexuálně stimulující účinky. V ČR není registrován.



flibanserin

Cinarizin

Lékopisný název: *Cinnarizinum*

Je to (*E*)-1-(difenylmethyl)-4-(3-fenylprop-2-en-1-yl)piperazin.

Přípravky: *STUGERON tbl. nob.*, *CINARIZIN LEK tbl. nob.*, v kombinaci s dimenhydrinatem ještě *ARLEVERT tbl. nob.*, *MEDOVERT tbl. nob.*

Trimetazidin

Lékopisný název: *Trimetazidini dihydrochloridum*

Je to 1-(2,3,4-trimethoxybenzyl)piperazin.

Přípravky: *PREDUCTAL MR tbl. ret.*, *PROTEVASC, tbl. pro.*, *TRIMETAZIDIN MYLAN tbl. pro.*, *TRIMETAZIDIN TEVA retard tbl. pro.ret.*, *ZULKEZA tbl. ret.*

Ranolazin


Je to (*R,S*)-*N*-(2,6-dimethylfenyl)-2-[4-[2-hydroxy-3-(2-methoxyfenoxy)-propyl]piperazin-1-yl]acetamid.

Přípravek: *RANEXA tbl. pro.*

1.1.4 Dihydropyridiny

Další skupinou vazodilatancií jsou deriváty 1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylové kyseliny. Jedná se o specifické antagonisty vápníkového kanálu, blíže je o celé skupině pojednáno v rámci kapitoly Antihypertenziva (str. 60). Pro skupinu léčiv s tímto mechanismem účinku je vyhrazena koncovka *-dipin*. Tyto deriváty jsou vazodilatačně vysoce aktivní, mají i výrazné hemodynamické vlastnosti. Většina z nich nalezla výhradní použití v terapii esenciální hypertenze, dále hypertenzní krize, vasospastické anginy pectoris (Prinzmetalova angina), chronické stabilní anginy pectoris a Raynaudova syndromu. Při profylaxi a terapii ischemických poruch CNS našly významné uplatnění lipofilnější sloučeniny. Zvýšená lipofilita je způsobena esterifikací karboxylových skupin v polohách 3 a 5 dihydropyridinového jádra rozvětvenými alkoholy (2-propanol), příp. alkoholy obsahujícími etherově vázaný kyslík (2-methoxyethanol).

Používaným derivátem je **nimodipin** (*NIMOTOP S tbl obd., DILCEREN inf. sol.*), lipofilní, nesymetrický diester 1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylové kyseliny, určený k prevenci a terapii mozkových cirkulačních poruch (terapie vasospasmů po subarachnoidálním krvácení).




nimodipin

1.1.5 Prostaglandiny a jejich analoga

Prostaglandiny (zkr. PG) jsou odvozeny od kyseliny arachidonové (all-*cis*-5,8,11,14-ikosatetraenová kyselina). Tyto dvacetuhlíkaté deriváty, tzv. ikosanoidy, jsou vysoce účinnými tkáňovými působky. Vyznačují se celou řadou fyziologických účinků, které se různí podle místa účinku. Ovlivňují prokrvení, tvorbu řady látek včetně hormonů a trávicích šťáv, srážení krve, účastní se imunitních a zánětlivých procesů, zvyšují stahy děložní svaloviny atd. Pro skupinu léčiv s touto strukturou a tímto mechanismem účinku je vyhrazen morfelem *-prost-*. Antitrombotické a vazodilatační účinky **epoprostenolu** (prostacyklin, PGI₂) jsou známé již


delší dobu. Jeho eliminační poločas je však velice krátký, u PGI_2 činí méně než šest minut. Tělu vlastní působky jsou navíc termolabilní (musí se uchovávat za snížené teploty), jejich terapeutické využití je proto omezené (podávají se v i.v. infuzích). Perspektivu mají stabilnější syntetické analogy prostaglandinů, tzv. prostanoidy, s přímým vazodilatačním účinkem na hladkou svalovinu cév. Jistou míru nepohodlí pro pacienta přináší způsob jejich podávání prostřednictvím kontinuálních nitrožilních nebo podkožních pump. V klinické praxi jsou dnes k dispozici i přípravky pro *p.o.* nebo inhalační podání.

Rozšíření skupiny periferních vazodilancií přineslo zavedení **alprostadilu** do terapie pokročilých stadií ischemie dolních končetin. Jedná se o syntetickou obdobu v organismu se přirozeně vyskytujícího prostaglandinu E_1 . Tento prostaglandin je rovněž využíván v terapii erektilní impotence.



alprostadil (prostaglandin E_1)

Ze skupiny prostaglandinů se dále používá v terapii poruch prokrvení končetin stabilní syntetický analog epoprostenolu (prostacyklinu, PGI_2) **iloprost**. Iloprost je stabilnější karbanalog PGI_2 , jedná se tedy o modifikaci typu izosterní náhrady enoetherového kyslíku za methylenovou skupinu. Iloprost je určený k léčbě plicní arteriální hypertenze, aplikuje se inhalačně, jeho eliminační poločas činí 60 až 120 min.



Novějším příspěvkem k terapii plicní arteriální hypertenze je dále derivát difenylpyrazinu **selexipag** (zaveden 2015), agonista prostacyklinových receptorů. Jedná se o syntetický prostanoid typu proléčiva, teprve jeho aktivní metabolit charakteru volné karboxylové kyseliny je selektivním agonistou prostacyklinových receptorů PGI₂. Výsledkem jeho působení je vazodilatace a snížená vaskulární rezistence a snížení srdečního minutového výdeje. Eliminační poločas účinného metabolitu je 6 až 14 hodin. Podává se perorálně.



Treprostinil

Je to (1*R*,2*R*,3*aS*,9*aS*)-(2,3,3*a*,4,9,9*a*-hexahydro-2-hydroxy-1-[(3*S*)-3-hydroxyoktyl]-1*H*-benz[*f*]inden-5-yl}oxy)octová kyselina.

Přípravek: *REMODULIN inf. sol.*, *TREPROSTINIL TILLOMED inf. sol.*, *TREPULMIX inf. sol.*, *TRESUVI inf. sol.*

Iloprost

Je to 5-{(*E*)-(1*S*,5*S*,6*R*,7*R*)-7-hydroxy-6[(*E*)-(3*S*,4*R*,*S*)-3-hydroxy-4-methyl-1-okten-6-ynyl]-bicyklo[3.3.0]oktan-3-yliden}pentanová kyselina.

Přípravek: *ILOPROST ZENTIVA sol. neb.*, *VENTAVIS sol. neb.*


Selexipag

Chemicky je to 2-{4-[(5,6-difenylypyrazin-2-yl)(propan-2-yl)amino]butoxy}-*N*-(methan-sulfonyl)acetamid.


Přípravek: *UPTRAVI tbl. flm.*

1.1.6 Antagonisté endotelinových receptorů


Antagonisté endotelinových receptorů brání vazokonstrikčnímu působení endotelinu 1 (ET 1). Používané sloučeniny jsou blokátory receptorů ET_A a ET_B. Pro skupinu léčiv s tímto mechanismem účinku je vyhrazena koncovka *-entan*. Společnými strukturními znaky jsou přítomnost pyrimidinu, kyselá sulfonamidové nebo karboxylové skupiny. Jejich indikací je terapie plicní arteriální hypertenze. Benzensulfonamidový derivát **bosentan** byl zaveden do praxe r. 2001, jeho eliminační poločas je 5–8 h, podává se perorálně. U dalšího pyrimidinového derivátu **ambrisentanu** (zaveden 2007) byla kyselá sulfonamidová skupina nahrazena karboxylovou. Ambrisentan je vysoce selektivní antagonist endotelinového receptoru ET_A s dlouhým eliminačním poločasem, který umožňuje podávání jednou denně. V porovnání s bosentanem se vyznačuje nižší hepatotoxicitou. Jeho dimethoxyanalogem je **darusentan**. Sulfonamidovou skupinu obsahuje **macitentan**, který se váže na endotelinové receptory výrazně delší dobu než výše uvádění antagonisté, jeho aktivní metabolit má eliminační poločas 48 h.




bosentan



ambrisentan



darusentan



macitentan

aktivní metabolit macitentanu

Bosentan

Je to 4-*tert*-butyl-*N*-[6-(2-hydroxyethoxy)-5-(2-methoxyfenoxy)-2-(pyrimidin-2-yl)pyrimidin-4-yl]benzen-1-sulfonamid.

Přípravky: *BOSENTAN ABDI tbl. flm.*, *BOSENTAN ACCORD tbl. flm.*, *BOSENTAN AVMC tbl. flm.*, *BOSENTAN PHARMASCIENCE INTERNATIONAL tbl. flm.*, *BOSENTAN WELDING tbl. flm.*, *STAYVEER tbl. flm.*, *TRACLEER tbl. flm.*

Ambrisentan

Je to (2*S*)-2-[(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)oxy]-3,3-difenyl-3-methoxypropanová kyselina.

Přípravky: *AMBRISENTAN ACCORD tbl. flm.*, *AMBRISENTAN MYLAN tbl. flm.*, *VOLIBRIS tbl. flm.*

Macitentan

Je to *N*-[5-(4-bromfenyl)-6-[2-[(5-brom-2-pyrimidinyl)oxy]ethoxy]-4-pyrimidinyl]-*N'*-propylsulfonamid.

Přípravky: *OPSUMIT tbl. flm.*